

STIKO-Empfehlungen - Historie

Zusammengestellt von: Fachgebiet Impfprävention, Robert Koch-Institut, Berlin



Impfung gegen	STIKO-Empfehlung (erstmalige Berufung der STIKO 1972)
Masern	1973 Standardimpfung (breit angewendet als MMR ab 1980)
	1991 2. Impfung ab 6. Lebensjahr
	2001 2. Impfung im 2. Lebensjahr
	2010 eine Dosis für nach 1970 geborene Erwachsene mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder nur 1 Impfung in Kindheit
Mumps	1976 Standardimpfung (breit angewendet als MMR ab 1980)
	1991 2. Impfung ab 6. Lebensjahr
	2001 2. Impfung ab 2. Lebensjahr
Röteln	1973 Standardimpfung für alle Mädchen, ab 1980 alle Kinder
	1991 2. Impfung ab 6. Lebensjahr
	2001 2. Impfung im 2. Lebensjahr
Diphtherie	1976 Standardimpfung (1. Impfkalender der STIKO, breit angewendet bereits ab 1960)
Tetanus (Wundstarrkrampf)	1976 Standardimpfung (1. Impfkalender der STIKO, breit angewendet bereits ab 1960)
Poliomyelitis (Kinderlähmung)	1976 Standardimpfung als Schluckimpfung (OPV) (1. Impfkalender der STIKO, breit angewendet bereits ab 1962)
	1998 als inaktivierter Impfstoff (IPV)
Influenza	1982 für chronisch Kranke, ab 60 Jahre und für med. Personal
	2002 Standardimpfung ab 60 Jahre; Indikationsimpfung für chronisch Kranke und med. Personal
	2010 Indikations-Ausweitung auf Schwangere
Pocken	1983 Impfung eingestellt
BCG (Tuberkulose)	1988 Impfung eingestellt
Hib	1990 Standardimpfung
Pertussis (Keuchhusten)	1991 Standardimpfung (mit Ganzkeimimpfstoff, ab 1994 azellulär)
	1997 Vervollständigung bzw. Nachholen der Grundimmunisierung bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
	2001 zusätzliche Auffrischimpfung von 9–17 Jahren
	2009 für Erwachsene nächstfällige Td-Impfung einmalig als Tdap-Kombi-Impfung
Hepatitis B	1995 Standardimpfung
Pneumokokken	2003 Standardimpfung, einmalig Pnk-Polysaccharid-Impfstoff ≥ 60 Jahre
	2006 für alle Kinder bis 24 Monate mit Pnk-Konjugat-Impfstoff
	2016 Aktualisierung zur Indikationsimpfung von Risikogruppen (sequenzielle Impfung) und Senioren
Varizellen (Windpocken)	2004 Standardimpfung mit 1 Dosis
	2009 Erweiterung auf 2 Dosen, zeitgleich mit MMR
Meningokokken	2006 für alle Kinder im 2. Lebensjahr mit konjugierten MenC-Impfstoff
	Nachholen fehlende Grundimmunisierung bis zum 18. Geburtstag
HPV	2007 Standardimpfung Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren
	2014 Impfalter 9-14 Jahre mit Nachholimpfung bis zum 18. Geburtstag
	2018 Standardimpfung Jungen von 9-14 Jahren mit Nachholimpfung bis zum 18. Geburtstag
Rotaviren	2013 Standardimpfung für Säuglinge